

L'acide (LSD) en bref

- ❖ Le LSD (diéthylamide de l'acide lysergique) est aussi connu sous le nom d'« acide », de « buvard » et sous bien d'autres noms. C'est une drogue hallucinogène synthétisée à partir d'une substance se trouvant sur un champignon qui pousse sur certaines céréales.
- ❖ À l'état pur, c'est un liquide ou une poudre cristalline inodore. Le LSD consommé dans la rue est souvent mélangé avec des substances colorées et vendu en gélules, en comprimés ou sous forme liquide. Habituellement, une goutte de liquide est déposée sur un petit papier buvard qui peut ressembler à un timbre ou à une petite image.
- ❖ Le LSD se prend généralement par voie orale, mais il peut aussi être inhalé ou absorbé par la peau ou par les muqueuses. Il peut aussi être injecté.
- ❖ Les effets du LSD se font sentir dans l'heure suivant son ingestion et peuvent durer de deux à 12 heures. L'expérience qu'il procure est imprévisible et peut aller du plaisir à la frayeur.

Exemples d'effets à court terme :

- dilatation des pupilles;
- perte de l'appétit;
- étourdissements;
- nausée, frissons, sueurs;
- augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle, de la température du corps et de la respiration;
- intensification des sensations;
- sentiment de puissance, sautes d'humeur et comportements inhabituels;
- altération de la perception du temps, visions ou hallucinations pouvant être agréables ou effrayantes (*bad trip*).

Exemples d'effets à long terme :

- baisse de motivation;
- panique;
- comportement irrationnel;
- déformation permanente de la réalité;
- dépression.

Autres risques :

- ❖ Certaines personnes peuvent avoir des « *flashbacks* » après avoir pris du LSD. Un *flashback* est une répétition des effets de la drogue sans en avoir repris. Ils peuvent se produire des jours, des semaines et même des années après la consommation. À ce jour, la recherche n'a pas encore expliqué les raisons des *flashbacks* de manière concluante.
- ❖ Le LSD ne semble pas entraîner de dépendance physique mais il peut créer une dépendance psychologique. La tolérance au LSD se développe rapidement.
- ❖ Le LSD peut causer des anomalies congénitales s'il est consommé pendant la grossesse.
- ❖ Comme d'autres drogues de la rue, le LSD peut contenir des substances inconnues, ce qui augmente les risques.
- ❖ En de rares occasions, une réaction psychotique peut survenir ou des problèmes mentaux peuvent s'aggraver chez les personnes qui ont déjà des problèmes de ce genre.

RAPPELEZ-VOUS : L'expérience d'une personne avec une drogue quelconque peut varier. En effet, un certain nombre de facteurs influent sur cette expérience, notamment : la quantité et la puissance de la drogue consommée, les conditions dans lesquelles elle est consommée, l'humeur ou les attentes de la personne avant de consommer ainsi que les expériences précédentes de cette personne avec la drogue en question.